

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

ANNEE 1955

931°

T H E S E

pour le

D O C T O R A T en M E D E C I N E

(diplôme d'Etat)

par

MARTIN Pierre,

né le 7 Octobre 1927 à MONTACHER (Yonne)

PRESENTÉE et SOUTENUE PUBLIQUEMENT le 19. .

" CONTRIBUTION A L'ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE DES
LUPO-ERYTHEMATO-VISCERITES MALIGNES " .

Président : Monsieur P. MOLLARET, Professeur

Dactylographiée

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

ANNEE 1955

N°

T H E S E

pour le

D O C T O R A T en M E D E C I N E

(diplôme d'Etat)

par

MARTIN Pierre,

né le 7 Octobre 1927 à MONTACHER (Yonne)

PRESENTEE et SOUTENUE PUBLIQUEMENT le 19. .

" CONTRIBUTION A L'ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE DES

LUPO-ERYTHEMATO-VISCERITES MALIGNES ".

Président : Monsieur P. MOLLARET, Professeur

Dactylographiée

DIPLÔME DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1922

N°

THÈSE

Pour le

DIPLOME DE MÉDECINE

(Spécialité de Médecine)

Par

MARTIN PIOTTE,

né le 7 octobre 1897 à MONTAIGNEY (Yonne)

PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 1922



"CONTRIBUTION À L'ÉTUDE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES

LEUCÉMYE-MYÉLO-VISCERIQUES MALIGNES"

Présentée et soutenue par M. PIOTTE, Professeur

Pratiquant

M. BAUDOUIN,

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BAUDOUIN, BRINDEAU, CADENAT, CARNOT, CHABROL, CHEVASSU, CHIRAY, CLERC, DELBET, GOUGEROT (H.), GUILLAIN, HARVIER, LAUBRY, LEMAITRE, LEMIERRE, LHERMITTE, LIAN, LOEPER, MARION, MATHIEU, MOCQUOT, MULON, OLIVIER (E.), OMBREDANNE, SANNIE, SEZARY, TANON.

DOYEN Léon LIET,
Membre de l'Institut

ASSEESSEUR Jean VERNE.

I. - PROFESSEURS

MM.

Anatomie	CORDIER. (G.)
Anatomie pathologique	DEJARUE (A.)
Bactériologie	GASTINEL. (P.)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	VERNE (J.)
Cancérologie médicale et sociale	HUGUENIN (R.)
Carcinologie	OBERLING (C.)
Chimie médicale	N.
	(Hôtel-Dieu) BROCCQ (P.)
	(Broussais) DE GAUDART-D'ALLAINES (F.)
Cliniques chirurgicales	(Salpêtrière) MONDOR (H.)
	(Cochin) QUENU (J.)
Clinique chirurgicale réparatrice et ortho- pédique	MERLE d'AUBIGNE. (R.)
Clinique de cardiologie	DONZELOT (E.)
Clinique de chirurgie infantile et d'ortho- pédie	FEVRE (M.)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire	MONOD (R.)
Clinique de la tuberculose	BERNARD (E.)
Clinique de neuro-chirurgie	PETIT-DUTAILLIS (D.)
Clinique de puériculture	DELONG (M.)
Clinique des maladies cutanées et syphiliti- ques	DEGOS (R.)
Clinique des maladies du sang	CHEVALLIER (P.)
Clinique des maladies du système nerveux	ALAJOUANINE (T.)
Clinique des maladies des enfants	DEBRE (R.)
Clinique des maladies infectieuses	MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encé- phale	DELAY (J.)
Clinique gynécologique	FUNCK-BRENTANO (P.)
	(Hôtel-Dieu) BENARD (H.)
	(Bichat) LAROCHE (G.)
Cliniques médicales	(Cochin) MOREAU (R.)
	(Broussais) DE GENNES (L.)
Clinique médicale d'hydro-électrologie théra- peutique	JUSTIN-BESANCON (L.)

Clinique médicale propédeutique	MASTEUR VALLERY-RODOT (L.)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition	BOULIN (R.)
Cliniques obstétricales { Tarnier	LANTUEJOUL (P.)
{ Baudelocques	LEVY-SOLAL (L.)
{ Port-Royal	LACOMME (M.)
Clinique ophtalmologique	VELTER (E.)
Clinique oto-rhino-laryngologique	RUBIN (A.)
Clinique physio-pathologique des problèmes alimentaires (chaire à titre personnel)	RICHET (C.)
Clinique psychiatrique infantile	HEUYER (C.)
Clinique rhumatologique et sociale	COSTE (F.)
Clinique stomatologique	DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale	SENEQUE (J.)
Clinique thérapeutique médicale	LEMAIRE (A.)
Clinique urologique	FEY (B.)
Embryologie	GIROUD (A.)
Génétique	LAMY (M.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie	MOUQUIN (M.)
Histologie	CHAMPY (C.)
Hygiène et clinique de la première enfance	CATHALA (J.)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (C.)
Médecine du travail	DESCILLE (H.)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (R.)
Parasitologie et histoire naturelle médicale	GALLIARD (H.)
Pathologie chirurgicale	MENEGAUX (G.)
Pathologie exotique	LAVIER (G.)
Pathologie expérimentale et comparée	LENEGRE (J.)
Pathologie humorale et immunologie expéri- mentale (chaire à titre personnel)	MENKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	BRIETY (M.)
Pathologie et thérapeutique générales	SIN (J.)
Pédiatrie Sociale	MARIE (J.)
Pharmacologie et matière médicale	HAZARD (R.)
Physico-chimie médicale (chaire à titre personnel)	DOGNON (A.)
Physiologie	BINET (L.)
Physique médicale	STROHL (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique chirurgicale	MOULONQUET (P.)
Thérapeutique	TURPIN (R.)

II. - PROFESSEURS SANS CHAIRE

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES ET AGREGES.

Anatomie	(DEBEYRE (J.) (DELMAS (A.) Pr. sans ch.)
Anatomie pathologique	(N... (GAUTHIER-VILLARDS (Melle P. (Pr. sans ch.) (BUSSE (F.) (GUYGOU (C.)

Bactériologie	{ FASQUELLE (R.) NEVOT (A.)
Biologie médicale	BOURLIERE (F.)
Chimie médicale	{ ETTORI (J.) Pr. s. ch. JAYLE (M.F.) Pr. s. ch. SHAPIRA (G.)
Dermato-Syphiligraphie	DUPERRAT (F.)
Histologie	{ BULLIARD (H.) Pr. s. ch. COUJARD (R.) N...
Hydrologie	DEBRAY (C.)
Hygiène	{ BOYER (J.) DEPARIS (M.)
Médecine légale et du travail	{ DEROBERT (L.) GAULTIER (M.) HADENGUE (L.)
Neurochirurgie	DAVID (M.)
Neurologie	SEZE (M. de)
	{ GRASSET (J.) LEPAGE (F.) MAYER (M.)
Obstétrique	{ MERGER (R.) MORIN (P.) RAVINA (J.) VARLINGOT (J.)
Ophtalmologie	{ OFFRET (G.) DESVIGNES (P.)
Orthopédie	JUDET (R.)
Oto-rhino-laryngologie	{ HALPHEN (E.) Pr. s. ch. AUBRY (M.) MADURO (R.)
Parasitologie	{ BRUMPT (L.) CHABAUD (A.)
Pathologie chirurgicale	{ ABOULKER (P.) BAUMANN (J.) GOSSET (J.)
	{ HUGUIER (J.) LAURENCE (G.) LEGER (L.)
Pathologie chirurgicale	{ LORTAT-JACOB (J.) OLIVIER (Cl.) PADOVANI (P.) POILLIEUX (M.) ROUX (M.) RUDLER (J.C.) VERNE (J.M.)

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

1950

() INFORMATION
 () ATTACHED
 () INDEXED

100

(.01) (.01) (.01)

1914

MM,

Pathologie expérimentale	N... (BRTNARD (J.) (BOUDIN (G.) (CASTAIGNE (P.) (CONTE (M.) (DECOURT (J.) (DOMART (A.) (DREYFUS (Gilbert) (FAUVERT (R.)
Pathologie médicale	(HAMBURGER (J.) (KOURILSKY (R.) (LAMOTTE (M.) (LAROCHÉ (C.) (MILLIEZ (P.) (PEQUIGNOT (H.) (PERRAULT (M.) (RAMBERT (P.) (THIEFFRY (St.) (TURIAF (J.)
Pédiatrie	(JOSEPH (R.) (LAPLANE (R.) (N...
Pharmacologie	(LEVY (Mlle J.) Pr. sans ch. (CHEVALER (J.H.) Pr. sans ch.
Physiologie	(BARGETON (D.) Pr. sans ch. (PARROT (J.L.)
Physique médicale	(DJOURNO (A.) Pr. sans ch. (GOUGEROT (L.)
Pneumo-Phtisiologie	KREIS (B.)
Psychiatrie	BARUK (H.)
Psychiatrie infantile	MICHAUX (L.)
Stomatologie	(CERNEA (P.) (CHAPUT (Mme A.)
Thérapeutique	PERRAULT (chargé de l'enseignement)
Urologie	KUSS (P.)

1. 1990年12月15日，在“中国—东盟”贸易合作会议上，中国外经贸部副部长朱镕基在会上的讲话中，首次提出“中国—东盟自由贸易区”的概念。

..... 2010-2011

..... $\sin 11.31^\circ$

• • • • •

6. A. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 84

..... **THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

[illegible]

• 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 104

..... *Journal of Technology*

.....

..... 1963-64 100.00

..... 154

III. - PROFESSEURS HONORAIRES et AGREGES

RAPPELES à l'EXERCICE
pour le service des examens

MM. BRINDEAU (A.) (Obstétrique), GATELLIER (J.)
(Clinique chirurgicale)
LE LORIER (V.) (Obstétrique), VAULETTE (R.) (Obstétrique)

IV. - PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES

CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE
à titre permanent.

MM.	:	MM.
Clinique (AMELINE (A.))	:	(HAGUENAU (M.)) P.s.c
chirurgicale.... (PATEL (J.))	:	(MARCHAL (G.))
(SICARD (A.))	:	(SOULIE (E.))
Clinique (BROUET (G.))	:	Clinique obstétricale
médicale..... (CACHERA (R.))	:	ECALLE (G.)
	:	Clinique ophtalmo-
	:	logique RENARD (G.)
	:	Clinique urologique COUVELAIRE (R.)

MM.

Secrétaire général de la faculté. MORL (J.)
Secrétaire Melle CHAINTREUIL (G.)

Conservateur, chargé de la direction. Docteur HAHN (A.)
Conservateur Mlle COICHON

Bibilothécaires (Mlles DUMERIE P., LE NOIR (G.),
(MELIN (P.), QUIEVREUX (E.))

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a
arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui se-
ront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni
improbation.

[illegible]

1890

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

1990

1997

[illegible]

1900

... ..

1900

1900

A Monsieur le Professeur MOLLARET

qui m'a fait l'honneur d'accepter
la présidence de cette thèse
qu'il daigne recevoir l'hommage de ma
gratitude.

A Monsieur le Docteur ROY

que je tiens à remercier de ses
conseils toujours bienveillants.

I N T R O D U C T I O N

Au cours des dix dernières années, les travaux cliniques, anatomiques, histologiques et thérapeutiques sur le lupus érythémateux aigu disséminé ~~se~~ sont multipliés.

Le tableau clinique, d'abord isolé, du cadre des affections dermatologiques, s'était déjà enrichi jusque là de syndrômes cardiaques, arthritiques et rénaux, constatations en apparence disparates, mais reflétant en réalité la richesse symptomatologique d'une maladie distincte par ses signes cliniques et son évolution propre. Récemment un certain nombre de formes cliniques sont venues s'ajouter à cette description.

Les anatémistes ont décrit les lésions particulières entraînées par cette affection au niveau des différents tissus et organes, du coeur, du rein en particulier.

L'histologie enfin est venue en montrer les affections pathognomoniques permettant d'en faire à coup sûr le diagnostic et de fixer les limites de cette affection dont les traductions cliniques s'avéraient multiples.

L'étiologie demeure encore une énigme malgré la multiplicité des hypothèses proposées.

Le pronostic en est grave, car si les auteurs décrivent dans les cas publiés jusqu'ici d'importantes rémissions, l'évolution en est très souvent fatale en un à trois ans.

De nombreuses méthodes thérapeutiques ont été préconisées, et si les plus récentes ont déjà apporté des résultats satisfaisants, il est peut-être encore prématuré de parler de guérison.

Un cas de lupo-érythémato-viscérite maligne confirmé au laboratoire par la présence de cellules de HARGRAVES chez un malade entré dans le service du Docteur ROY

Leucémie

... Au cours des leucémies, les cellules blanches du sang sont anormales, augmentées en nombre et de nature diverse. Elles sont caractérisées par une grande variété de formes et de dimensions. Les leucocytes normaux ont une forme ronde ou ovale, un noyau rond ou ovalaire, et une bordure cytoplasmique nette. Dans les leucémies, les cellules sont souvent plus grandes, avec des noyaux irréguliers, des nucléoles multiples, et une bordure cytoplasmique diffuse. Les leucocytes peuvent être classés en trois types principaux : les leucocytes myéloïdes, les leucocytes lymphoïdes, et les leucocytes monocytoïdes. Les leucocytes myéloïdes ont un noyau en forme de bâtonnet, des nucléoles multiples, et une bordure cytoplasmique nette. Les leucocytes lymphoïdes ont un noyau rond, un nucléole unique, et une bordure cytoplasmique nette. Les leucocytes monocytoïdes ont un noyau en forme de rein, un nucléole unique, et une bordure cytoplasmique nette. Les leucocytes peuvent être trouvés dans le sang, la moelle osseuse, et les tissus lymphatiques. Les leucocytes sont responsables de la réponse immunitaire et de la défense contre les infections. Les leucocytes peuvent être trouvés dans le sang, la moelle osseuse, et les tissus lymphatiques. Les leucocytes sont responsables de la réponse immunitaire et de la défense contre les infections.

... L'hématologie est une branche de la médecine qui étudie les cellules du sang et les troubles du sang. Les leucémies sont des cancers du sang qui affectent les cellules blanches du sang. Les leucémies peuvent être classées en quatre types principaux : les leucémies aiguës, les leucémies chroniques, les leucémies myéloïdes, et les leucémies lymphoïdes. Les leucémies aiguës sont des cancers du sang qui se développent rapidement et qui peuvent être mortels. Les leucémies chroniques sont des cancers du sang qui se développent lentement et qui peuvent être traités avec succès. Les leucémies myéloïdes sont des cancers du sang qui affectent les cellules myéloïdes du sang. Les leucémies lymphoïdes sont des cancers du sang qui affectent les cellules lymphoïdes du sang. Les leucémies peuvent être traitées avec des médicaments, des thérapies ciblées, et des greffes de moelle osseuse. Les leucémies peuvent être trouvés dans le sang, la moelle osseuse, et les tissus lymphatiques. Les leucocytes sont responsables de la réponse immunitaire et de la défense contre les infections. Les leucocytes peuvent être trouvés dans le sang, la moelle osseuse, et les tissus lymphatiques. Les leucocytes sont responsables de la réponse immunitaire et de la défense contre les infections.

à AUXERRE que nous tenons à remercier ici de ses conseils éclairés, nous a semblé digne d'être décrit. Il s'agit en effet d'une forme clinique évoluant sous l'aspect d'une polyarthrite chronique évolutive. L'évolution en a été stabilisée par le traitement à la nivaquine préconisé par GRUPPER.

o

o

o

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

- 3 -
- HISTORIQUE -

Le mérite de la première description du lupus érythémateux aigu disséminé revient à KAPOSI qui en 1872 dans son livre "Pathologie et Traitement des Maladies de la Peau" non seulement l'isole du lupus érythémateux décrit vingt ans auparavant par CAZENAVE pour en faire une maladie distincte, mais en montre déjà la complexité symptomatique et les tendances évolutives: "...Quelquefois aussi on observe une éruption aiguë fébrile qui s'accompagne d'endolorissements et d'épanchements articulaires... Dans un certain nombre de cas, nous avons vu un gonflement érisypélateux intense de la face accompagné d'un état thyphoïdique, d'une température dépassant 40°, de coma, de stupeur... Dans la moitié des cas, l'évolution a été fatale... Ce pronostic est grave en raison... des manifestations cérébrales qui l'accompagnent..."

BESNIER et DOYON à leur tour en soulignent la gravité, les complications cardiaques, rénales et pulmonaires.

SIR WILLIAM OSLER rapporte dans son mémoire sur "L'Erythème exudatif Multiforme" deux cas qui s'apparentent vraisemblablement à la maladie de KAPOSI.

En 1924, LIBMANN et SACHS décrivant une forme d'endocardite valvulaire et murale amicrobienne relatent chez deux de leurs malades des lésions cutanées rappelant de très près celles du lupus érythémateux. Ils ne reconnaissent pas, d'ailleurs ce que l'Endocardite verruqueuse stypique comportant d'imprécis et de limitatif.

Aussi lorsque BAEHR, KLEMPNER, et SCHIFRIN retrouvent parmi leurs cas de lupus érythémateux aigu des lésions d'endocardite verruqueuse et que KEIL en donne le pourcentage de 30 à 50% on est en droit de penser avec GROSS et H.E. CLOUXTON qu'il ya un rapport étroit entre les deux affections.

LIAN, SIGUIER, DUBERAT et SARRAZIN en 1947 trouvent la conception d'une affection tantôt à polarisation

dermatologique, tantôt cardiaque, encore trop étroite et ils attribuent les lupo-érythémato-viscérites malignes à un processus général provoquant simultanément, par un même mécanisme, des lésions cutanées et des lésions viscérales multiples. Ils les classent dans le groupe des dermato-viscérites, parmi lesquelles ils rangent la maladie de BERNIER-BOECK-SCHAUMANN et le Trisyndrome de GOUGEROT.

L'Etude anatomique des différents tissus et organes (depuis GROSS et KLEMPERER) pouvant être atteints par l'affection a mis en évidence des modifications du tissu conjonctif :

dégénérescence enbrinoïde des fibres collagènes et des parois des artérioles, au niveau du rein en particulier; les artérioles glomérulaires présentent la typique déformation en "wire loop" présence souvent constatée des corps basophiles de GROSS.

Toutes ces atteintes anatomiques paraissent classer l'affection parmi les collagénoses de KLEMPERER. Il ne faut toutefois pas méconnaître les restrictions apportées par DE BRUX et PAU trier à propos de cette classification.

Cette extension du cadre de la maladie aurait pu provoquer un regroupement trop étendu d'affections possédant avec le lupus érythémateux certains liens de parenté morbide.

Mais la mise en évidence par HARGRAVES, RICHMOND et MORTON en 1948 et par HASERICK et BORTZ en 1949 d'anomalies des polynucléaires dues à un facteur plasmatique particulier représente un élément de discrimination très important avec les affections frontalières en plus d'un moyen précieux de diagnostic.

A l'aide de ces notions, les auteurs distinguent un certain nombre de formes cliniques des dermato-viscérites dont l'aspect varie à l'extrême de l'une à l'autre :

I - Les formes où les atteintes viscérales multiples de l'affection sont représentées en des proportions variables, mais toutes présentes. Elles ont été grou-

.../...

pées par LIAN SIGUIER DUPERRAT et SARRAZIN sous le nom de lupo-érythémato-viscérites malignes.

- 2 - les formes où l'atteinte cardiaque est au premier plan : c'est l'endocardite verruqueuse de LIBMANN-SACHS.
- 3 - les formes où l'atteinte cutanée prédomine : **lupus exanthématique** de KAPOSI et BESNIER.
- 4 - les formes où les signes articulaires **suragent**, comme l'ont montré JAUSION, MASSARI, **BENARD** et KOUCHNER.
- 5 - les formes à prédominance des signes **encéphaliques**.
On a signalé aussi un certain nombre de faits de passage.
 - les formes avec myosite, fait de passage avec la dermato-myosite de WAGNER.
 - les formes avec éruptions bigarrées : fait de passage avec la poïkilo-dermato-myosite de PETGES.
 - les formes avec hémocultures positives : fait de passage avec l'endocardite d'OSLER.

Nous venons donc de voir comment le **lupus érythémateux aigu disséminé** avait été isolé parmi les dermatoses du **lupus érythémateux** comme une affection autonome.

Actuellement encore s'opposent deux thèses : certains auteurs envisagent les formes aiguës et chroniques comme une même maladie & ils évoquent en cela l'analogie des modifications anatomo-pathologiques et la possibilité de lésions de passage, par d'autres, les deux formes, aiguës et chroniques, du **lupus érythémateux** n'étant que des manifestations d'un même

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

9. The ninth part of the report...

10. The tenth part of the report...

11. The eleventh part of the report...

12. The twelfth part of the report...

13. The thirteenth part of the report...

14. The fourteenth part of the report...

15. The fifteenth part of the report...

16. The sixteenth part of the report...

17. The seventeenth part of the report...

18. The eighteenth part of the report...

19. The nineteenth part of the report...

20. The twentieth part of the report...

21. The twenty-first part of the report...

22. The twenty-second part of the report...

23. The twenty-third part of the report...

24. The twenty-fourth part of the report...

25. The twenty-fifth part of the report...

RAPPEL CLINIQUE

Le lupus erythémateux aigu disséminé est d'après le professeur DEGOS une maladie de l'adulte jeune. Il atteint le plus souvent les femmes entre vingt et trente ans. Pour certains auteurs l'influence endocrinienne est nette : une poussée aigue pouvant être provoquée par une grossesse et une rémission évolutive pouvant être observée après ovariectomie; d'autres la nient : castration et traitement par la testostérone n'ont à leur avis pas d'action sur l'évolution.

Un certain nombre de facteurs déclenchants ont été remarqués dont plusieurs semblent importants : l'exposition
solaire,

les facteurs infectieux qui joueraient un rôle de sensibilisation.

Le début de l'affection est en général insidieux et déconcertant.

Le plus souvent, c'est l'atteinte articulaire qui prélude, sous la forme d'une polyarthrite évoquant le rhumatisme articulaire aigu. La température est souvent élevée, irrégulière, et une atteinte importante et progressive de l'état général se manifeste.

Parfois, ce sont des signes neurologiques qui sont au premier plan : troubles d'allure comitiale, délire aigu.

Les atteintes articulaires sont variables, comme dans le rhumatisme articulaire aigu : toutes les articulations peuvent être atteintes et suivant différents modes : douleurs, tuméfactions articulaires.

Des adénopathies sont fréquemment constatées au niveau de toutes les aires ganglionnaires, ce sont en général de petits ganglions durs, mobiles, roulant sous les doigts.

.../...

[illegible]

Les *exanthèmes* peuvent survenir soit lors de la première flambée d'arthralgie; soit avec un certain retard.

Au niveau du visage, prurit et oedème précèdent parfois l'apparition d'un erythème symétrique du milieu de la face. Celui-ci s'étend en placards plus ou moins bien limités envahissant progressivement le visage, allant parfois même jusqu'au décolleté. Il est recouvert de squames et donne une impression rugueuse à la palpation.

On note parfois un oedème palpebral et une bouffissure de la face.

On observe également des lésions semblables au niveau du dos des mains et des doigts, des coudes, des genoux; ce sont des lésions *maculo-papuleuses* qui s'accompagnent parfois de telangectasies et de "white centred patches".

La bouche est dans certains cas parsemée d'érosions herpétiformes entourées d'un anneau carminé. La face interne des joues est parfois recouverte d'exsudats diphtéroïdes.

De multiples atteintes viscérales ont été observées:

- toutes les séreuses peuvent être atteintes : pleurésie, péricardite.
- atteintes cardiaques : endocardite verruqueuse de LIBMANN-SACHS. Le malade se plaint très fréquemment soit de précordialgie lancinante, soit d'algies précordiales fugaces. Tachycardie, souffle.
- atteintes rénales : néphrite subaiguë avec albuminurie, cylindrurie, hématurie microscopique.
- à l'examen du fond de l'oeil on peut constater : oedème papillaire, rétinite exsudative.

Les *exanthèmes* ne sont pas exception-

1. *Pharmaceutical industry*—United States—History. I. Title. II. Series.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

...the ...

[illegible]

... ..

... ..

nelles, mais isolées ou au niveau des poussées : troubles épileptiques, hémiplésiques, psychoses ou thromboses cérébrales.

L'EVOLUTION se fait par poussées toxiques et hyperthermiques successives avec recrudescence des signes généraux, articulaires et cutanés, auxquels peuvent venir s'ajouter des manifestations rénales ou nerveuses.

LES COMPLICATIONS PULMONAIRES (congestion pulmonaire, bronchopneumonie) peuvent venir agraver l'évolution.

AU COURS DE L'ETAT INTERMITTENT aigu disséminé, on constate les modifications des protéines sanguines :

- La vitesse de sédimentation des hématies est accélérée : même corrigée pour compenser l'anémie, elle est supérieure à l'accélération des affections aiguës, atteignant parfois 100mm dans la première heure.
Le fractionnement des protéines sériques selon HOWE montre une augmentation importante des globulines et une diminution des albumines.
- Le thymol-test a des valeurs élevées.
- Le Hanger est positif.
- Le protéinogramme électrophorétique révèle une augmentation considérable des globulines et une diminution des albumines. Déséquilibre qui peut s'améliorer avec la clinique par le traitement avec la cortisone ou l'ACTH.

MAIS CE SONT LES MODIFICATIONS cytologiques qui apportent la certitude du diagnostic.

Les frottis de moelle osseuse et de sang veineux périphérique prélevés dans des conditions spéciales (sous-héparin) mettent en évidence la présence des

- tart cells : histiocytes contenant des inclusions retrouvées dans des affections variées,
- Les cells polynucléaires contenant une masse arrondie, éosinophile d'aspect le plus souvent uniforme, caractéristique du lupus érythémateux aigu.
- des agglutinations de polynucléaires autour d'une masse arrondie amorphe basophile (résultats).

Ces deux derniers aspects sont le résultat de phénomènes de phagocytose dus à la présence d'une globuline dont la teneur variable avec la phase évolutive donne soit des agglutinations, soit les cellules du lupus de Hargraves.

T R A I T E M E N T

De multiples traitements ont été opposés à cette maladie mais se sont bientôt, les uns après les autres, montrés insuffisants à entraîner la guérison

Parallèlement au traitement proposé pour le lupus érythémateux chronique, on a préconisé tout à tour :

- les métaux lourds : or, bismuth, arsenic, employés de 1920 à 1950,
- différents composés chimiques : salicylate de soude, sulfamides, thiosemicarbazone, hydrazide de l'acide isonicotinique, atébrine,
- les médications biologiques : extrait de foie, plasma, transfusions.
- les vitamines, vitamine E en particulier,
- la mycothérapie.

Toutes ces thérapeutiques reflétant l'incertitude étiologique qui est encore maintenant la caractéristique du lupus érythémateux.

Tout à tour furent invoquées : l'étiologie tuberculeuse par BESNIER ainsi que par DARIER et PAUTRIER qui le classaient ~~dans les~~ tuberculides, arguant des réactions locales très importantes présentées par les malades à la tuberculine.

- l'étiologie syphilitique
- l'étiologie streptococcique
- enfin l'étiologie virale, la maladie étant due à un germe spécifique encore inconnu.

HENSCH et KENDALL en 1949 rapportent la première observation de lupus érythémateux disséminé guéri par la cortisone, hélas des rechutes après arrêt du traitement se produisirent.

Cependant, corticotrophine et cortisone demeurèrent d'excellentes médications dans la thérapeutique

.../..

d'urgence.

C'est en 1954 que LISNER et PURCELL utilisent les antipaludéens de synthèse dans le traitement du lupus érythémateux chronique, mais leurs travaux ne trouvent alors que peu d'écho. Cependant en 1948 l'atobrène ou quinaquine ou mépacrène occupe la première place dans l'action thérapeutique anti-lupus.

GOLDMANN et PRESTON en 1953 publient les résultats du traitement du lupus érythémateux chronique par la nivaquine.

GRUPPER en Novembre 1953 se basant sur les travaux de HECHT, LATASTE, FAIRHARD, SHANNON, BRODIE, BERLINIER en rapportent 36 cas de guérison.

Il semble que les anti-paludéens de synthèse, et plus particulièrement la nivaquine, soient venus renforcer puissamment l'arsenal thérapeutique du lupus érythémateux.

GRUPPER, KARTER, HEWITT et DAUSSET présentent en 1954 le premier cas de lupus érythémateux aigu disséminé et traité avec succès par la nivaquine seule.

Que faut-il penser de toutes les thérapeutiques proposées ?

- Les anti-biotiques, tout d'abord, seuls se sont révélés incapables de guérir la maladie. Cependant, des facteurs infectieux peuvent jouer un rôle dans le lupus érythémateux. GAY PRIETO retient en s'appuyant sur la conception non spécifique de ROST le rôle des infections (streptococcique bacillaire intestinales) comme sensibilisant du tegument à des agents physiques (radiations, froids) (infections accidentelles) (respiratoires surtout, intoxications médicamenteuses), conception suivant laquelle le lupus érythémateux serait une réaction allergique et hyperergique.

Il insiste donc dans son traitement sur l'importance de la destruction des foyers septiques : amygdalite, sinusite, granulomes dentaires, appendicite chronique, et pour cela l'aide efficace des anti-biotiques semble précieuse.

- La corticotrophine et la cortisone ont fait preuve d'une action salvatrice sur la poussée aiguë, mais ils n'ont que peu d'influence sur l'évolution de la maladie.

Les principes directeurs du traitement sont les suivants :

- pour la cortisone : intramusculaire ou par os 200 ou 300 mg par 24 heures comme dose d'attaque ramenés le plus rapidement possible par paliers décroissants vers la dose d'entretien, dose la plus réduite capable de maintenir la rémission.
- pour l'ACTH, intramusculaire de préférence. En 4 injections, la dose est de 100 mg, réduite par la suite comme pour la cortisone.

L'ACTH présente sur la cortisone l'inconvénient des injections répétées.

L'action sur les signes cliniques est rapide : la température tombe, les douleurs disparaissent, l'état général s'améliore rapidement. Les manifestations cutanées, les arthrites, les épanchements pleuraux et les lésions rétro-orbitales sont plus lentement améliorées. Les modifications des protéines sanguines rentrent également dans l'ordre.

Malheureusement, dès qu'on cesse

le traitement, les signes de l'affection ne tardent pas à réapparaître; or, la conduite de semblables traitement est malaisée; le maintien de doses même peu importantes est susceptible d'entraîner de graves accidents de surdosage. Une surveillance du poids, de la tension, le régime déchloruré strict, un apport supplémentaire de potassium sont autant de mesures de sécurité nécessaires pour éviter la rétention hydrosodique et l'hypokaliémie. L'arrêt du traitement est parfois même nécessaire lorsque des troubles neuro-psychiques se manifestent et les accidents infectieux posent souvent par leur allure torpide de délicats problèmes de diagnostic. D'autre part, si les modifications protéiques sanguines sont améliorées, certainement, mais cela ne peut pas le pouvoir de faire disparaître les cellules de Hargraves.

Certes ces médicaments permettent de réduire l'importance des poussées aiguës, mais ils n'apportent pas la guérison, puisque subsistent les modifications biologiques typiques de la maladie.

L'emploi de la nivaquine est encore trop récent pour que l'on puisse préjuger de sa valeur. Cependant la bonne tolérance du produit et les résultats obtenus font espérer de grandes possibilités par la nivaquine seule; GRUPPER traitant un lupus érythémateux disséminé préconise un traitement d'attaque à 1 gr 30 par jour jusqu'à disparition des signes cliniques, puis un traitement d'entretien prolongé à 0 gr 30 par jour. Dans le cas qu'il rapporte, au

.../...

bout de six jours de traitement, la température revient à la normale, les myarthralgies, les signes renaux et cardiaques, les lésions cutanées disparaissent. Fait important, les cellules de HARGRAVES disparaissent du sang, de même que les anomalies histo-chimiques et antomo-pathologiques.

De même LAYANI rapporte un cas de lupus aigu ayant résisté à la cortisone et amélioré par la nivaquine.

Les phénomènes d'intolérance des antipaludéens de synthèse bien connus actuellement sont peu à craindre aux doses préconisées; ce sont le plus souvent : des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des nausées, des brûlures oesophagiques ou hypogastriques auxquelles on a pu remédier en évitant de prescrire le médicament à jeun et en conseillant la prise au milieu du repas enrichi en hydrates de carbone. Plus fréquentes sont l'asthénie et l'insomnie, l'amaigrissement signalé par COLDMANN, insuffisamment expliquée par l'anorexie à laquelle on peut remédier par un régime hypercalorique particulièrement riche en protides. Les troubles visuels sont plus impressionnants. Ce sont essentiellement les troubles de l'accommodation, accompagnés de céphalée dûs à une atteinte légère et transitoire des processus ciliaires.

Le mode d'action de la nivaquine demeure inexplicable. GRUPPER avance les mêmes hypothèses que PAGE pour la quinacrine.

Ils remarquent que 90% du produit ingéré traverse la muqueuse intestinale pour être stocké dans le foie, le rein et la rate; dans le plasma la substance se concentre à un taux atteignant le plafond plus ou moins rapidement suivant la dose ingérée. Sur les leucocytes, la fixation est beaucoup plus élevée que sur les hématies.

.../...

Agit-elle par :

- 1/- action cortisone-like, bien que l'on n'ait pas constaté de diminution des éosinophiles;
- 2/- action antagoniste sur les composés adenyliques produits par les tissus atteints de lupus érythémateux.
- 3/- action sur la désoxyribonucléase.
- 4/- action spécifique sur l'agent du lupus érythémateux aussi hypothétique l'existence même de celui-ci
- 5/- diminution de la photo-sensibilisation, si fréquente chez les sujets atteints.

La nivaquine semble donc, dans le traitement du lupus érythémateux chronique et aigu, un médicament remarquable par la rapidité de l'amélioration clinique qu'elle entraîne et par sa bonne tolérance.

Mais certains auteurs prétendent qu'un traitement limité dans le temps est incapable à lui seul d'assurer une guérison stable et définitive et qu'on est dans l'obligation d'envisager soit la prescription d'une dose d'entretien, soit l'association à la nivaquine l'une autre thérapeutique.

O B S E R V A T I O N

Pierre C...., pupille de l'Assistance Publique, âgé de 34 ans, brancardier à l'Hôpital d'Auxerre, entré le 23 mars 1953 dans le service du Docteur ROY pour des douleurs violentes de la hanche et de la cuisse droites qui évoquent alors le diagnostic d'arthrite de la hanche. Une asthénie importante et un amaigrissement importants se manifestent; la température est peu élevée.

Ce malade présentait des antécédents de rhumatisme articulaire aigu pour lesquels il avait été hospitalisé à Paris à deux reprises.

- à l'âge de 13 ans il avait été hospitalisé aux Enfants Malades pour des fluxions articulaires au niveau des mains et des pieds, accompagnées de température à 40° et d'oligurie traitées à l'aide de salicylate de soude.

Il semble qu'au cours de ce premier séjour de 8 mois à l'Hôpital le malade ait fait une atteinte, grave, de rhumatisme articulaire aigu, compliqué d'un épisode bronchitique surajouté.

- à l'âge de 19 ans il ressent une gêne précordiale et des malaises cardiaques qui le font hospitaliser à Conhin où l'on constate un souffle systolique de pointe.

A l'issue de ce séjour d'un mois et il est traité par de la glace sur la région précordiale, il n'est pas retenu de lésion cardiaque organique.

Par la suite le malade passe cinq ans en captivité au cours desquelles il se plaint de fourmillements dans les épaules.

A son retour, il ressent de vives douleurs dans la cuisse droite qui l'obligent à s'immobiliser presque complètement pendant trois jours puis disparaissent totalement.

A cette époque son poids était de 82 Kilogrammes.

En 1952 il subit une ablation de la cloison nasale dont la déviation entraînait une gêne importante et des rhinopharyngites à répétition.

C'est en Mars 1953 qu'il commence à "tirer la jambe", à se plaindre d'une asthénie et d'un amaigrissement progressifs.

A son entrée dans le service, il ressent des douleurs violentes dans la cuisse et la hanche droites, apparues d'abord à la fatigue, puis au repos, débutant assez brutalement au milieu de la nuit, le réveillant et l'obligeant à rechercher des positions antalgiques. Il présente une gêne fonctionnelle du membre inférieur droit qui entraîne une impotence importante.

A l'examen on constate une altération de l'état général (il pèse alors 62 Kgs 400)

- une adynamie,
- une certaine limitation des mouvements des hanches. Si les mouvements de flexion-extension sont normaux, les mouvements de rotation et d'adduction sont très limités.

Le reste de l'examen clinique est négatif. Les bruits du coeur sont un peu accélérés et assourdis, mais normaux; la radiographie des hanches montre aucune lésion anormale. L'examen complet des urines est normal. La vitesse de sédimentation est légèrement accélérée :

15mm	à 1 heure
28.....	de 2 heures
80.....	de 24 heures
puis: 26.....	d'une heure
55.....	de 2 heures
120.....	de 24 heures.

La gono réaction est négative.

Le traitement par radiothérapie et injections intra-articulaires d'hydrocortisone dans la hanche droite n'entraîne qu'une amélioration légère et passagère.

Vers la fin du mois de Juillet 1953, on a pour témoin d'une reprise violente des arthralgies coïncidant avec un épisode rhinopharyngé. Le Malade présente une angine érythomato-pultacée, des douleurs paroxystiques sur un fond continu dans la hanche droite puis la hanche gauche.

Les mouvements d'adduction-abduction des deux hanches et de rotation sont très limités. Les mouvements de flexion-extension sont limités.

Le malade présente des sueurs profuses.

Sa température oscille entre 38 ° et 39 °.

Sa sédimentation est élevée : 77mm au bout d'une heure.

Sa numération et formule sanguines montrent 4.240.000 hématies et 9.300 leucocytes dont

72% de polynucléaires,

18% de lymphocytes,

8% moyens mononucléaires

2% de monocytes.

Tour à tour les diverses thérapeutiques classiques sont entreprises, le salicylate de soude, le gentisate de soude puis les sels d'or. Ces derniers sont très mal supportés par le malade et à la suite d'ictère on leur substitue la corticothérapie associée aux antibiotiques. La dose d'attaque de 200mg est progressivement réduite à la dose d'entretien de 75 mg par 24 heures.

Mais si l'état articulaire s'améliore et si la vitesse de sédimentation revient peu à peu à la normale

22mm au bout d'une heure,

45mm..... de 2 heures,

71mm..... de 24 heures.

ces traitements sont impuissants à freiner l'apparition des recrudescences des signes généraux et articulaires :

- le malade continue à maigrir et pèse au mois d'octobre 52 Kg. Cependant une reprise de poids et une amélioration nette de l'état général est enregistrée à partir du moment où l'on emploie la cortisone prescrite au moment d'une poussée aigue.

Mais lorsqu'on veut l'interrompre à la fin du mois de décembre après deux mois de cette thérapeutique, des rechutes de plus en plus violentes et rapprochées obligent à la reprendre.

Le dépistage des foyers d'infection latente éventuels et la précession remarquable d'angine sur les épisodes évolutifs font pratiquer de nombreuses extractions dentaires sur des caries infectées et une amygdalectomie le 20 janvier 1954.

L'affection dont est atteint le malade est à cette époque considérée comme une polyarthrite chronique évolutive.

Au mois de mars 1954 alors que la dose d'entretien de cortisone était de 50 mg, le malade présente une poussée évolutive grave qui débute par une rhinopharyngite accompagnée d'une sensation de gêne à la déglutition.

La température s'élève jusqu'à 40°, les arthralgies s'exaspèrent.

Le malade présente des lèvres fuligineuses. La bouche est parsemée d'érosions herpétiformes entourées d'une zone érythémateuse, la face interne des joues montre de petites excoriations parfois recouvertes d'un exsudat blanchâtre.

La plaque érythémateuse ayant dévuté sur les pommettes et à la base des ailes du nez s'étend progressivement à toute la face, laissant le menton

et même la partie antérieure du cou. Cet erythème est recouvert de squames blanchâtres et très prurigineux.

Au dos des mains le malade présente des lésions erythémato-squameuses infectées.

Son poids est à cette époque de 50 Kg.

Il se plaint de malaises cardiaques et on remarque une tachycardie à 100.

Il est oligurique et on trouve à l'examen des urines quelques hématies.

La radiographie des hanches montre un important pincement bi-latéral des interlignes articulaires.

Une hémoculture est négative. La vitesse de sédimentation est de 40 mm en une heure. La numération et formule sanguine montre 4.500.000 hématies, 27 300 leucocytes avec 94% de polynucléaires.

La cortisone est reprise à une dose d'attaque de 200 mg et on y adjoint 2 g de terramycine par 24 heures. :

Les signes généraux disparaissent en 4 jours

Les arthralgies diminuent d'intensité.

Les urines sont normales.

Mais la sédimentation reste accélérée.

Mais le malade ayant présenté un état soit de prostration extrême, soit d'agitation désordonnée et par moments un délire avec idées de suicide qui semble majoré par la thérapeutique, les doses sont réduites.

Une ponction lombaire montre un liquide céphalo-rachidien, clair non hypertendu, de caractéristiques normales.

Les signes cutanés disparaissent en trois semaines sans laisser aucune trace : on ne remarque aucune atrophie cicatricielle.

On émet à cette date l'hypothèse qu'il s'agit d'un lupus érythémateux aigu disséminé malgré la disparition complète des signes cutanés et l'absence

.../...

de lésions viscérales nettes. On pense qu'il s'agit d'une forme clinique à prédominance polyarthritique; il existe en effet au niveau des hanches des signes typiques de coxarthrose.

Un traitement par la phénylbatazone est tenté dans l'intervalle de 2 cures de cortisone mais il n'empêche pas l'apparition d'une rechute et il n'est pas poursuivi.

Le malade, malgré la thérapeutique, présente plusieurs accès fébriles par mois et c'est au cours de l'un d'eux, en octobre 1954 qu'on retrouve sur un frottis de sang périphérique prélevé sous héparine et après incubation à 37° selon la technique de Mathis, la présence de cellules de Hargraves :

le 1er jour les frottis montrent une nucléolyse assez importante, un certain nombre de polynucléaires contenant des masses basophiles. Il n'existe pas de formations en rosette

le deuxième et le troisième jour on ne trouve aucun élément anormal.

Le diagnostic histologique est confirmé par le Docteur Bessis du laboratoire du Centre National de Transfusion Sanguine,

Le diagnostic du lupo-érythémato-viscérinite maligne se trouve ainsi confirmé et le traitement par la nivaquine suivant le schéma de Grupper immédiatement entrepris :

Les signes cliniques s'améliorent rapidement. La vitesse de sédimentation revient à la normale.

Les cellules de Hargraves retrouvées encore au début de novembre 1955 sont absentes en décembre.

Le malade reprend du poids.

Les cures discontinues de cortisone sont poursuivies aussi bien à titre de traitement adjuvant qu'eutrophique en même temps qu'un régime hypercalo-

rique et protidique associé à la vitamine B I2.

Les accès aigus depuis cette date ne se sont pas renouvelés.

Au mois de décembre 1954 le malade fait un épisode bronchopneumonique grave.

Actuellement le malade pèse 62 Kg. Il présente encore des arthralgies diffuses, mais beaucoup moins importantes qu'avant le traitement par la nivaquine; une certaine mobilisation des ses membres inférieurs lui redevient peu à peu possible.

C O N C L U S I O N S

I/- Il semble que le cas de lupo-érythémato-viscéríte décrit dans l'observation que nous avons rapportée, cas confirmé par la présence dans le sang veineux périphérique de cellules de Hargraves, ait évolué sous la forme d'une polyarthrite chronique évolutive ainsi que le diagnostic en avait été porté au début de l'affection.

Coste, Pignet, Lacronique et Françon ainsi que quelques autres auteurs ont déjà décrit des formes cliniques polyarthritiques du lupus érythémateux aigu disséminé et, nous pensons que le cas précédent entre dans ce cadre. Les manifestations articulaires ont toujours été au premier plan des signes cliniques. Les atteintes viscérales si tant est qu'elles existent, ont été extrêmement légères :

l'atteinte cardiaque n'a été marquée que par des douleurs précordiales vagues, une certaine tachycardie en période de poussée.

l'atteinte rénale par une oligurie, une hématurie lors de la poussée évolutive la plus importante.

quant aux signes cutanés, ils n'ont été qu'épisodiques et peu marqués : ils ont disparu rapidement grâce à la thérapeutique locale banale et générale et n'ont laissé aucune trace.

2/- Du point de vue thérapeutique nous ne pensons pas qu'il importe d'insister longuement sur le rôle des infections locales déjà mis en relief par nombre d'auteurs. Mais le fait qu'une notable amélioration de l'affection se soit manifestée après le traitement curatif des foyers infectieux découverts semble manifeste dans notre observation :

il existait chez notre malade des foyers infectieux au niveau des amygdales et des dents.

Plus important nous semble l'introduction dans la thérapeutique du lupus érythémateux aigu disséminé de la Nivaquine de GRUPPER.

La cortisone a été certes un médicament précieux au cours des poussées aiguës de la maladie ainsi que les antibiotiques :

au cours de la poussée aiguë la plus grave observée chez le malade ils ont eu une action salvatrice, ils ont fait regresser en majeure partie les signes cliniques, mais s'ils ont entraîné une amélioration de l'état humoral, ils n'ont pas fait disparaître les cellules de Hargraves, preuve du potentiel évolutif de la maladie.

La nivaquine, ainsi que l'ont montré GRUPPER et LAYANI, a, dans le cas présent, entraîné une stabilisation de l'affection.

Outre l'amélioration clinique, nous avons constaté la disparition des cellules de Hargraves.

A partir du moment où cette thérapeutique a été mise en oeuvre, les poussées aiguës ont totalement disparu.

Les résultats obtenus grâce à la nivaquine et l'excellente tolérance du produit sur laquelle insistent les auteurs permettent de considérer cet antipaludéen de synthèse comme un médicament d'avenir dans le traitement du lupus érythémateux aigu disséminé.

Vu, le Doyen :

L. BINET

Vu, le Président de Thèse :

P. MOLLARET.

Vu et Pourvu d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris :

J. SARRAILH.

BIBLIOGRAPHIE

- BERTAND L.: "Les cellules de la Lupus-érythémato-viscérite maligne" Bull. pronomenc.
(Presse Médicale. 1952, 60, n°42, 929-932).
- BRUNSTING L.A.: "Le lupus érythémateux aigu disséminé".
Med. Clin. North Amer. Mars 1951, 339-403.
- COSTE F., PIGNET B., LACHENIQUE F., FRANCON J.:
"Lupus érythémateux aigu disséminé à forme polyarthritique confiné par la présence de cellules de Hargraves".
Bull. et Mém. Soc. Méd. HOP. Paris, 26 février 54, 177-203.
- DE BRUX: "Constitution chimique de la substance fondamentale et gliales dites du collagène".
Presse Méd. 1951, 59, 627-630.
- DELHOUME G.: "Contribution à l'étude des Lupus-érythémato-viscérite malignes".
Thèse Méd. Paris 1954, 907.
- GRUPPER C.: "Lupus érythémateux et anti-paludéens de synthèse".
Expérience personnelle avec la nivaquine. A propos de 36 cas.
Bull. Soc. Franc. Derm. 1953, N° 5, 423.
- GRUPPER C., RAULT B., HENRIET J., DAUSSET J., LAVEGNE R.:
"Lupus érythémateux aigu disséminé, guérison avec la nivaquine seule".
Sem. Hôp. Paris, 1954, 30, 4327.
- HASERIK J.R.: "Le facteur simple dans le lupus érythémateux aigu disséminé. Le test L.S.".
New-York Stat J. Med, 50, 20, 2445-2446.
- JAUSTON H., MARTIN R., BERNARD J., Mollie Janine DECAUD:
"Les acquisitions récentes en matière de lupus érythémateux aigu disséminé".
Soc. Méd. chir. Hôp. Libr. de France. 3.6.1954

- JAUSION H., MASSART R., BERNARD P., COUCHNER G. :
 "Sur un nouveau cas de lupus érythémateux subaigu
 à forme polyarticulaire."
 Bull. Med. Soc. Fr. Derm. et Syp., 81, 3, 1955, 278.
- KLEMPERER P. : "Modifications dans la définition du lupus
 érythémateux aigu disséminé".
 Jour. Mont Sinai, 6sp; Mars-Avril 1951, 17,
 N° 6, 793-798.
- LAGAROSSE B. : "Traitement du lupus érythémateux par la
 nivaquine".
 Thèse Med. 1954, 286.
- LECLERC R. : "Action de la cortisone et de l'ACTH sur le lu-
 pus érythémateux disséminé".
 Fr. Med. 1951, 14, N° 10, 7.
- LIAN, SIGUIER, DUPERRAT, SARRAZIN : "Les lupo-érythémato-
 viscérites malignes".
 Sem. Des Hôp. 1947, 23, 1905-1921.
- MAHAUT J., DENOLIN-REUBENS R., MASCART Ph. : "Les caractères
 biologiques du lupus érythémateux aigu dissé-
 miné".
 Rev. Hématol., 8, 1, 1953.
- MASSARI R. : "Les manifestations articulaires du lupus érythé-
 mateux".
 Thèse Med. Paris 1954, 199.

